

# ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

## Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

### ΑΝΑΛΥΣΗ

#### Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος»

1. \* Η διαδικασία, με την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου  $A$  αντιστοιχίζεται σ' ένα ακριβώς στοιχείο ενός άλλου συνόλου  $B$  είναι συνάρτηση. Σ    Λ
2. \* Η διαδικασία, με την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου  $A$  αντιστοιχίζεται σε περισσότερα του ενός στοιχεία ενός άλλου συνόλου  $B$  είναι συνάρτηση. Σ    Λ

*Στις παρακάτω ερωτήσεις όλες οι συναρτήσεις είναι πραγματικές συναρτήσεις με πεδίο ορισμού ένα υποσύνολο του  $R$ .*


3. \* Η σχέση  $f$ , με τύπο  $f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ ρητός} \\ 1, & x \text{ άρρητος} \end{cases}$ , είναι συνάρτηση. Σ    Λ
4. \* Η σχέση  $x^2 + y^2 = 1$  όπου  $x, y \in R$ , είναι συνάρτηση. Σ    Λ
5. \* Η σχέση  $g$  με τύπο  $g(x) = x^2$  είναι συνάρτηση. Σ    Λ
6. \* Η σχέση  $f$  με τύπο  $f(x) = 20x$  είναι συνάρτηση. Σ    Λ
7. \* Η σχέση  $h$  με τύπο  $h(t) = \pm \sqrt{2t}$ ,  $t \in R^+$ , είναι συνάρτηση. Σ    Λ

8. \* Η σχέση  $f$  με τύπο  $f(t) = \sqrt{2t}$ ,  $t \in \mathbb{R}^+$ , είναι συνάρτηση. Σ Λ
9. \* Αν για μια συνάρτηση  $f$ , που έχει πεδίο ορισμού το  $A \subseteq \mathbb{R}$ , ισχύει  $f(x) = f(y)$  για κάποια  $x, y \in A$ , τότε  $x = y$ . Σ Λ
10. \* Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  ορίζονται και οι δύο σ' ένα σύνολο  $A$ , τότε και η συνάρτηση  $S = f + g$  ορίζεται στο ίδιο σύνολο. Σ Λ
11. \* Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  ορίζονται και οι δύο σ' ένα σύνολο  $A$ , τότε και η συνάρτηση  $h = \frac{f}{g}$  ορίζεται πάντοτε στο ίδιο ακριβώς σύνολο. Σ Λ
12. \* Μια συνάρτηση γνησίως μονότονη είναι πάντοτε γνησίως αύξουσα. Σ Λ
13. \* Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση είναι συνεχής. Σ Λ
14. \* Οι συναρτήσεις  $f(x) = \eta\mu x$  και  $g(x) = \sigma\upsilon\eta x$  είναι συνεχείς. Σ Λ
15. \* Η συνάρτηση  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $x > 0$ , είναι συνεχής. Σ Λ
16. \* Η συνάρτηση  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $x < 0$ , είναι συνεχής. Σ Λ
17. \* Η έννοια της συνέχειας μιας συνάρτησης αναφέρεται μόνο σε σημεία του πεδίου ορισμού της. Σ Λ
18. \* Μια συνάρτηση  $f$ , με πεδίο ορισμού το  $A$ , λέγεται συνεχής, αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του συνόλου  $A$ . Σ Λ
19. \* Μια συνάρτηση  $f$  λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα  $\Delta$  του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε σημεία  $x_1, x_2 \in \Delta$  με  $x_1 > x_2$  ισχύει  $f(x_1) < f(x_2)$ . Σ Λ
20. \* Μια συνάρτηση  $f$  λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα  $\Delta$  του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε σημεία  $x_1, x_2 \in \Delta$  με  $x_1 < x_2$  ισχύει  $f(x_1) < f(x_2)$ . Σ Λ
21. \* Η παράγωγος  $f'(x_0)$  μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης  $f$  σ' ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της είναι πραγματικός αριθμός. Σ Λ
22. \* Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης που είναι η γραφική παράσταση μιας παραγωγίσιμης

- συνάρτησης  $f$ , στο σημείο  $(x_0, f(x_0))$  αυτής, είναι η παράγωγος της  $f$  στο  $x_0$ . Σ Λ
23. \* Η παράγωγος μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης  $f$  σ' ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της  $y = f(x)$ , ως προς  $x$ , όταν  $x = x_0$ . Σ Λ
24. \* Η παράγωγος  $f'(x_0)$  μιας συνάρτησης  $f$  σ' ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της ισούται με το 
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, h \in \mathbb{R}, h \neq 0.$$
 Σ Λ
25. \* Μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της, όταν και μόνο όταν υπάρχει το 
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, h \in \mathbb{R}, h \neq 0.$$
 Σ Λ
26. \* Η συνάρτηση  $f(x) = |x|$  είναι παραγωγίσιμη στο σημείο  $x_0 = 0$ . Σ Λ
27. \* Η συνάρτηση  $f(x) = |x|$  είναι συνεχής στο σημείο  $x_0 = 0$ . Σ Λ
28. \* Αν μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της, τότε το όριο 
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, h \neq 0,$$
 ισούται με τον συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης, που είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης  $f$  στο σημείο  $(x_0, f(x_0))$  αυτής. Σ Λ
29. \* Η παράγωγος της συνάρτησης  $f(x) = \sqrt{x}$  είναι 
$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$
 Σ Λ
30. \* Η παράγωγος της συνάρτησης  $g(x) = x^q$ , όπου  $q \in \mathbb{Q}$ , είναι  $g'(x) = qx^{q-1}$ . Σ Λ
31. \* Οι παράγωγοι των συναρτήσεων  $f(x) = \eta\mu x$  και  $g(x) = \sigma\upsilon\nu x$  είναι αντίστοιχα  $f'(x) = (\eta\mu x)' = \sigma\upsilon\nu x$  και  $g'(x) = (\sigma\upsilon\nu x)' = -\eta\mu x$ . Σ Λ
32. \* Οι παράγωγοι των συναρτήσεων  $E(x) = e^x$  και  $L(x) = \ln x$  είναι αντίστοιχα  $E'(x) = (e^x)' = e^x$  και  $L'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x}$ . Σ Λ
33. \* Αν η πρώτη παράγωγος μιας συνάρτησης  $g$  είναι η σταθερή συνάρτηση  $1$ , τότε η  $g$  είναι της μορφής  $g(x) = cx, c \in \mathbb{R} - \{1\}$ . Σ Λ
34. \* Αν η πρώτη παράγωγος μιας πολυωνυμικής συνάρτησης

- $g$  είναι 4ου βαθμού, τότε η  $g$  είναι 5ου βαθμού. Σ Λ
35. \* Αν η δεύτερη παράγωγος μιας πολυωνυμικής συνάρτησης  $g$  είναι σταθερή, τότε η  $g$  είναι το πολύ 2ου βαθμού. Σ Λ
36. \* Η συνάρτηση  $f'$  με  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ ,  $h \neq 0$ , όπου  $x$  τα σημεία του πεδίου ορισμού της  $f$  στα οποία η  $f$  είναι παραγωγίσιμη, λέγεται (πρώτη) παράγωγος της  $f$ . Σ Λ
37. \* Η παράγωγος (αν υπάρχει) της συνάρτησης  $g'$  λέγεται πρώτη παράγωγος της  $g$ . Σ Λ
38. \* Η παράγωγος (αν υπάρχει) της συνάρτησης  $g''$  λέγεται τρίτη παράγωγος της  $g$ . Σ Λ
39. \* Η παράγωγος της συνάρτησης  $f(x) = 5$  είναι  $f'(x) = 5x$ . Σ Λ
40. \* Η παράγωγος της συνάρτησης  $s(t) = t$  είναι  $s'(t) = 1$ . Σ Λ
41. \*\* Θέσεις πιθανών ακρότατων συνάρτησης  $f$  ορισμένης και συνεχούς σ' ένα διάστημα  $\Delta$  είναι μόνο τα σημεία στα οποία η  $f$  παραγωγίζεται. Σ Λ
42. \*\* Αν η συνάρτηση  $f$  παρουσιάζει τοπικό ακρότατο σ' ένα εσωτερικό σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της, και υπάρχει η παράγωγος  $f'(x_0)$ , τότε  $f'(x_0) = 0$ . Σ Λ
43. \*\* Αν για συνάρτηση  $f$ , ορισμένη και συνεχή σ' ένα διάστημα  $\Delta$ , υπάρχει η  $f'(x_0)$  και είναι  $f'(x_0) \neq 0$ , με  $x_0$  εσωτερικό σημείο του  $\Delta$ , τότε το  $x_0$  είναι θέση τοπικού ακρότατου της  $f$ . Σ Λ
44. \*\* Έστω συνάρτηση  $f$ , ορισμένη και συνεχής σ' ένα διάστημα  $\Delta$ . Τα εσωτερικά σημεία του  $\Delta$ , στα οποία η  $f$  παραγωγίζεται και η παράγωγος ισούται με μηδέν, είναι θέσεις πιθανών τοπικών ακροτάτων της. Σ Λ
45. \*\* Έστω συνάρτηση  $f$ , ορισμένη και συνεχής σ' ένα διάστημα  $\Delta$ . Τα εσωτερικά σημεία  $x$  του  $\Delta$ , στα οποία η  $f$  παραγωγίζεται και η παράγωγος  $f'(x)$  ισούται με μηδέν, αποτελούν πάντοτε θέσεις τοπικών ακροτάτων της. Σ Λ
46. \*\* Αν η συνάρτηση  $f$  παρουσιάζει τοπικό ακρότατο σ' ένα εσωτερικό σημείο  $x_0$  ενός διαστήματος του πεδίου ορισμού της και είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$ , τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της  $f$  στο σημείο  $(x_0, f(x_0))$  είναι παράλληλη στον άξονα  $x'x$ . Σ Λ






47. \*\* Στο σχήμα παρουσιάζεται η γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης  $f$ . Να χαρακτηρίσετε με (Σ) ή (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:








- |       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| i.    | Το πεδίο ορισμού της $f$ είναι $[-2, 7]$ .  | Σ | Λ |
| ii.   | Το πεδίο ορισμού της $f$ είναι $(-2, 7]$ .  | Σ | Λ |
| iii.  | Η συνάρτηση $f$ παρουσιάζει στο διάστημα $(2, 4)$ τοπικό μέγιστο, για $x = 3$ .                                     | Σ | Λ |
| iv.   | Ισχύει ότι $f'(3) \neq 0$ .   | Σ | Λ |
| v.    | Ισχύει $f'(x) > 0$ για $x \in (2, 3)$ και $f'(x) > 0$ για $x \in (3, 4)$ .  | Σ | Λ |
| vi.   | Στο διάστημα $(2, 3)$ η συνάρτηση $f$ είναι αύξουσα.  | Σ | Λ |
| vii.  | Ισχύει $f'(5) \neq 0$ .   | Σ | Λ |
| viii. | Οι εφαπτόμενες της γραφικής παράστασης της $f$ στα σημεία $(3, f(3))$ και $(5, f(5))$ είναι παράλληλες μεταξύ τους. | Σ | Λ |
| ix.   | Στο διάστημα $(0, 2)$ η συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο για $x = 1$ .   | Σ | Λ |
| x.    | Ορίζεται το $f'(1)$ .   | Σ | Λ |

### Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. \* Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι γραφική παράσταση συνάρτησης;




2. \* Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα είναι γραφική παράσταση συνάρτησης;



3. \* Το διπλανό διάγραμμα είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης

**A.**  $f(x) = \begin{cases} x^2, & -\infty < x \leq 1 \\ 2, & 1 < x \end{cases}$

**B.**  $f(x) = \begin{cases} x^2, & -\infty < x < 1 \\ 2, & 1 \leq x \end{cases}$



**Γ.**  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & -\infty < x < 1 \\ 2, & 1 \leq x \end{cases}$

**Δ.**  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & -\infty < x \leq 1 \\ 2, & 1 < x \end{cases}$

**Ε.**  $f(x) = \begin{cases} e^x, & -\infty < x < 1 \\ 2, & 1 \leq x \end{cases}$

4. \* Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης, με γραφική παράσταση που παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα, είναι


**A.**  $[0, 3]$

**B.**  $[0, \infty)$


**Γ.**  $(0, 3)$

**Δ.**  $(0, +\infty)$

**Ε.**  $[0, 4]$




5. \* Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης, με γραφική παράσταση που παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα, είναι
- A.  $(-\infty, 2)$       B.  $(-\infty, 3]$   
 Γ.  $(-\infty, +\infty)$       Δ.  $(-\infty, 3]$   
 E.  $(0, 3]$




6. \* Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$  είναι
- A.  $[-1, 1]$       B.  $[-1, \infty)$       Γ.  $(-1, 1)$       Δ.  $(-\infty, 1]$       E.  $(-\infty, +\infty)$

7. \* Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  είναι
- A.  $[-1, 1]$       B.  $[-1, \infty)$       Γ.  $(-1, 1)$       Δ.  $(-\infty, 1]$       E.  $(-\infty, +\infty)$

8. \* Το διάγραμμα που παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης
- A.  $f(x) = -x$       B.  $f(x) = x$   
 Γ.  $f(x) = \frac{1}{x}$       Δ.  $f(x) = -\frac{1}{x}$   
 E.  $f(x) = -2x$



9. \* Το διάγραμμα που παρουσιάζεται στο διπλανό σχήμα είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης
- A.  $f(x) = x^2$       B.  $f(x) = -x^2$   
 Γ.  $f(x) = -\frac{1}{x^2}$       Δ.  $f(x) = \frac{1}{x^2}$   
 E.  $f(x) = \frac{1}{x}$



10. \* Αν οι συναρτήσεις  $f, g$  έχουν κοινό πεδίο ορισμού το  $A \subseteq \mathbb{R}$ , τότε η συνάρτηση  $h = \frac{f}{g}$  έχει πεδίο ορισμού
- A. το σύνολο  $\mathbb{R}$       B. τα  $x \in A: f(x) \neq 0$       Γ. τα  $x \in A: g(x) \neq 0$   
 Δ. τα  $x \in A: f(x) = 0, g(x) \neq 0$       E. τα  $x \in A: f(x) = g(x) = 0$

11. \* Μια συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής στο σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της, αν και μόνο αν

A. ισχύει  $f(x_0) = 0$


B. ισχύει  $f(x_0) \neq 0$

Γ. υπάρχει το  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$


Δ. ισχύει  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Ε. ισχύει  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$


12. \*




σχ.1




σχ.2



σχ.3



σχ.4



σχ.5

Στα παραπάνω σχήματα παρουσιάζονται πέντε γραφικές παραστάσεις ισάριθμων συναρτήσεων. Στη θέση  $x_0$  συνεχής είναι η συνάρτηση

A. του σχήματος 1

B. του σχήματος 2

Γ. του σχήματος 3

Δ. του σχήματος 4

Ε. του σχήματος 5

13. \* Μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της, αν και μόνο αν

A. υπάρχει το  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(h)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$

B. υπάρχει το  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$

Γ. υπάρχει το  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$  και είναι πραγματικός αριθμός



$$\Delta. \text{το } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = +\infty, \quad h \in \mathbb{R}, \quad h \neq 0$$

$$\text{E. το } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = -\infty, \quad h \in \mathbb{R}, \quad h \neq 0$$

14. \* Η παράγωγος μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης  $f$ , σ' ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της, εκφράζει

A. την τιμή της συνάρτησης στη θέση  $x_0$

B. την τιμή του κλάσματος  $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ,  $h \neq 0$

Γ. το ρυθμό μεταβολής της  $f(x)$  ως προς  $x$ , όταν  $x = x_0$

Δ. το ρυθμό μεταβολής της  $f(x)$  ως προς  $x - x_0$

E. κανένα από τα παραπάνω

15. \* Παράγωγο  $f'(x_0)$  μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης  $f$  σ' ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της ονομάζουμε

A. το πηλίκον  $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$

B. το  $\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0))$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$

Γ. το  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$

Δ. το  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$

E. το πηλίκον  $\frac{f(x_0 + h)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$

16. \* Εάν  $S(t)$  είναι η θέση ενός κινητού τη χρονική στιγμή  $t$ , που κινείται ευθύγραμμα, τότε

το κλάσμα  $\frac{S(t_0 + h) - S(t_0)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$  εκφράζει

A. τη στιγμιαία ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή  $t = t_0$

B. τη μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα  $[t_0, t_0 + h]$

Γ. τη μέση τιμή της επιτάχυνσης στο χρονικό διάστημα  $[t_0, t_0 + h]$

Δ. τη στιγμιαία τιμή της επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή  $t = t_0$

E. τη διαφορά του διαστήματος που διήνυσε το κινητό από τη χρονική στιγμή  $t_0$  μέχρι τη χρονική στιγμή  $t_0 + h$

17. \* Εάν  $S(t)$  είναι η θέση ενός κινητού τη χρονική στιγμή  $t$ , που κινείται ευθύγραμμα, τότε η

τιμή  $A = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{S(t_0 + h) - S(t_0)}{h}$ ,  $h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$  εκφράζει

A. τη στιγμιαία ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή  $t = t_0$

- Β.** τη μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα  $[t_0, t_0 + h]$
- Γ.** τη μέση τιμή της επιτάχυνσης στο χρονικό διάστημα  $[t_0, t_0 + h]$
- Δ.** τη στιγμιαία τιμή της επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή  $t = t_0$
- Ε.** τη διαφορά του διαστήματος που διήνυσε το κινητό από τη χρονική στιγμή  $t_0$  μέχρι τη χρονική στιγμή  $t_0 + h$
- 18. \*\*** Αν η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε διάστημα  $\Delta \subseteq \mathbb{R}$  και γνησίως φθίνουσα στο  $\Delta$ , τότε η  $f'$  είναι αρνητική
- Α.** μόνο σ' ένα σημείο του  $\Delta$
- Β.** σε όλα τα εσωτερικά σημεία του  $\Delta$
- Γ.** στο σημείο μηδέν
- Δ.** μόνο στα σημεία που μηδενίζουν την  $f$
- Ε.** κανένα από τα παραπάνω
- 19. \*** Αν για συνάρτηση  $f$  παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα  $\Delta$ , ισχύουν  $f'(x_0) = 0$  και  $f''(x_0) < 0$ , με  $x_0$  εσωτερικό σημείο του  $\Delta$ , τότε η συνάρτηση  $f$
- Α.** παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο για  $x = x_0$
- Β.** είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το διάστημα  $\Delta$
- Γ.** παρουσιάζει τοπικό μέγιστο για  $x = x_0$
- Δ.** δεν παρουσιάζει ακρότατο για  $x = x_0$
- Ε.** είναι σταθερή συνάρτηση
- 20. \*** Αν για συνάρτηση  $f$ , παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα  $\Delta$ , ισχύουν  $f'(x_0) = 0$  και  $f''(x_0) > 0$ , με  $x_0$  εσωτερικό σημείο του  $\Delta$ , τότε η συνάρτηση  $f$
- Α.** παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο για  $x = x_0$
- Β.** είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το διάστημα  $\Delta$
- Γ.** παρουσιάζει τοπικό μέγιστο για  $x = x_0$
- Δ.** δεν παρουσιάζει ακρότατο για  $x = x_0$
- Ε.** είναι σταθερή συνάρτηση
- 21. \*** Η συνάρτηση  $f$ , παραγωγίσιμη σ' ένα ανοικτό διάστημα  $\Delta$ , είναι γνησίως αύξουσα στο  $\Delta$ , αν ισχύει
- Α.**  $f'(x) = 0$ , για κάθε σημείο  $x$  του  $\Delta$
- Β.**  $f(x) = 0$ , για κάθε σημείο  $x$  του  $\Delta$
- Γ.**  $f'(x) > 0$ , για κάθε σημείο  $x$  του  $\Delta$
- Δ.**  $f'(x) < 0$ , για κάθε σημείο  $x$  του  $\Delta$
- Ε.** κανένα από τα παραπάνω
- 22. \*** Η συνάρτηση  $f$ , παραγωγίσιμη σ' ένα ανοικτό διάστημα  $\Delta$ , είναι γνησίως φθίνουσα στο  $\Delta$ , αν ισχύει
- Α.**  $f'(x) = 0$ , για κάθε σημείο  $x$  του  $\Delta$
- Β.**  $f(x) = 0$ , για κάθε σημείο  $x$  του  $\Delta$
- Γ.**  $f'(x) > 0$ , για κάθε σημείο  $x$  του  $\Delta$
- Δ.**  $f'(x) < 0$ , για κάθε σημείο  $x$  του  $\Delta$

- Ε.** κανένα από τα παραπάνω
- 23.** \*\* Έστω συνάρτηση  $f$ , παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα  $\Delta$  και  $x_0$  εσωτερικό σημείο του  $\Delta$  για το οποίο υπάρχει  $f''(x_0)$ . Το εσωτερικό σημείο  $x_0$ , είναι σημείο ακροτάτου της  $f$ , αν ισχύει
- A.**  $f(x_0) = 0$                       **B.**  $f'(x_0) \neq 0$                       **Γ.**  $f''(x_0) = 0$   
**Δ.**  $f'(x_0) = 0$  και  $f''(x_0) \neq 0$   
**Ε.**  $f'(x_0) > 0$  και  $f(x_0) = 0$
- 24.** \* Η παράγωγος της συνάρτησης  $f(x) = x^2$  είναι (για  $h \neq 0$ )
- A.**  $\lim_{h \rightarrow 2} \frac{h(2x+h)}{h}$                       **B.**  $\lim_{h \rightarrow 0} h(2x+h)$                       **Γ.**  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$   
**Δ.** 2    **Ε.**  $x$
- 25.** \* Αν ο μεγιστοβάθμιος όρος μιας πολυωνυμικής συνάρτησης είναι  $ax^a$ , όπου  $a \neq 0$ ,  $a \neq 1$ , τότε η παράγωγός της είναι
- A.** σταθερή συνάρτηση  
**B.** τριγωνομετρική συνάρτηση  
**Γ.** πολυωνυμική συνάρτηση με μεγιστοβάθμιο όρο τον  $a^2x^{a-1}$   
**Δ.** πολυωνυμική συνάρτηση με μεγιστοβάθμιο όρο τον  $ax^{a-1}$   
**Ε.** δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε χωρίς τον τύπο της συνάρτησης
- 26.** \* Η συνάρτηση  $h(x) = \sqrt{x^2}$  είναι
- A.** σύνθεση των συναρτήσεων  $f(x) = \sqrt{x}$  και  $g(x) = x$   
**B.** σύνθεση των συναρτήσεων  $f(x) = x^2$  και  $g(x) = \sqrt{x^2}$   
**Γ.** άλλη μορφή της συνάρτησης  $f(x) = x$   
**Δ.** άλλη μορφή της συνάρτησης  $f(x) = |x|$   
**Ε.** κανένα από τα παραπάνω
- 27.** \* Η συνάρτηση  $f(x) = \eta\mu 3x$  είναι
- A.** άλλη μορφή της συνάρτησης  $f(x) = 3\eta\mu x$   
**B.** η παράγωγος της συνάρτησης  $f(x) = \sigma\upsilon\nu 3x$   
**Γ.** σύνθεση των συναρτήσεων  $f(x) = \eta\mu x$ ,  $g(x) = 3x$   
**Δ.** η παράγωγος της συνάρτησης  $f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu 3x}{3}$   
**Ε.** κανένα από τα παραπάνω
- 28.** \* Αν  $L(x) = f(g(x))$ , όπου  $f, g$  παραγωγίσιμες συναρτήσεις, τότε

- A.  $L'(x) = f'(g(x))$
- B.  $L'(x) = f'(x) \cdot g'(x)$
- Γ.  $L'(x) = f'(x) + g'(x)$
- Δ.  $L'(x) = f'(g(x)) \cdot f(x)$
- Ε.  $L'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

### Ερωτήσεις αντιστοίχισης

1. \* Αντιστοιχίστε τον κάθε τύπο συνάρτησης της στήλης Α με το διάστημα ή ένωση διαστημάτων της στήλης Β, που είναι το πεδίο ορισμού της.







Στήλη Α	Στήλη Β
$f(x) = 2x$	R
$f(x) = \frac{3}{x-1}$	(0, 1)
$f(x) = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$
$f(x) = \sqrt{x-1}$	$(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$
$f(x) = \frac{2x}{x+1}$	$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
	(1, $\infty$ )
	[1, $\infty$ )

2. \* Αντιστοιχίστε τον κάθε τύπο συνάρτησης της στήλης Α με το διάστημα ή ένωση διαστημάτων της στήλης Β, που είναι το πεδίο ορισμού της.








Στήλη Α	Στήλη Β
$f(x) = \sqrt{x}$	[0, $+\infty$ )
$f(x) = \sqrt{x+2}$	[-2, $+\infty$ )
	$(-2, 0) \cup (0, +\infty)$
	$(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$	$(0, +\infty)$ $(-2, 0) \cup (0, \infty)$ $(-2, +\infty)$
---	---






3. \* Αντιστοιχίστε τον κάθε τύπο της συνάρτησης της στήλης Α με τη γραφική της παράσταση στη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. $f(x) = -3x^2 + 2$	(Α)  (Δ) 
2. $\varphi(x) = \frac{6}{x}$	(Β)  (Ε) 
3. $h(x) = -2x + 5$	(Γ)  (Ζ) 


4. \* Στη στήλη Α παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις τριών συναρτήσεων. Αντιστοιχίστε καθεμιά από αυτές με τη γραφική παράσταση της πρώτης παραγώγου της που βρίσκεται στη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
<p>(1) </p> <p>(2) </p> <p>(3) </p>	<p>(Α) </p> <p>(Β) </p> <p>(Γ) </p> <p>(Δ) </p>

5. \* Στη στήλη Α παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων. Αντιστοιχίστε καθεμιά από αυτές με τη γραφική παράσταση της πρώτης παραγώγου της που βρίσκεται στη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
<p>(1) </p> <p>(2) </p>	<p>(Α) </p> <p>(Β) </p> <p>(Γ) </p>

6. \* Στη στήλη Α παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων. Αντιστοιχίστε καθεμιά από αυτές με τη γραφική παράσταση της πρώτης παραγώγου της που βρίσκεται στη στήλη Β.





7. \* Αντιστοιχίστε κάθε τύπο συνάρτησης που είναι στη στήλη Α με τον τύπο της συνάρτησης της πρώτης παραγώγου της που είναι στη στήλη Β.

Στήλη Α $f(x)$	Στήλη Β $f'(x)$
$3x^2$	$6x^2 - 1$
$3x$	$6x$
$2(x^2 - 1)$	$3$
$(3x)^2$	$4x$
$(3x - 1)^2$	$3x - 1$
$3x^2 - x$	$18x$
	$6(3x - 1)$
	$6x^2$
	$6x - 1$

8. \* Αντιστοιχίστε κάθε τύπο συνάρτησης που είναι στη στήλη Α με τον τύπο της συνάρτησης της πρώτης παραγώγου της που είναι στη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
$f(x)$	$f'(x)$
$\alpha$	0
$\alpha x$	$\alpha$
$\beta x + \alpha$	$\beta$
$\alpha x^2 + \beta$	$2\alpha x$
$\beta x^2$	$2\beta x$
$\alpha x^2 - \beta x$	$2\alpha x - \beta$
$\beta x^2 + \alpha x - \gamma$	$2\beta x + \alpha$
	$2\alpha + \beta x$

9. \* Στη στήλη Α του παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα πρώτα μέλη ισοτήτων, οι οποίες εκφράζουν τους κανόνες παραγωγισής. Στη στήλη Β υπάρχουν τα δεύτερα μέλη των ισοτήτων αυτών. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β ώστε να προκύψουν οι γνωστοί κανόνες παραγωγισής.

Στήλη Α	Στήλη Β
	$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
$(cf(x))' =$	$\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$
$(f(x) + g(x))' =$	$f'(x) + g'(x)$
$(f(x) \cdot g(x))' =$	$cf'(x)$
$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' =$	$f'(x) \cdot g'(x)$
$[f(g(x))]' =$	$f'(g(x)) \cdot g'(x)$
	$\frac{f'(x)}{g'(x)}$

### Ερωτήσεις συμπλήρωσης - σύντομης απάντησης

1. \* Να συμπληρώσετε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α)  $f(x) = \sqrt{x^2}$        $A = \dots\dots\dots$

β)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$        $A = \dots\dots\dots$

γ)  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$        $A = \dots\dots\dots$

δ)  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$        $A = \dots\dots\dots$

ε)  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$        $A = \dots\dots\dots$

2. \* Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -2$ , να βρείτε και να συμπληρώσετε τα  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ , όταν:

α)  $g(x) = 3f(x) - 1$        $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \dots\dots\dots$

β)  $g(x) = 2 - 4f(x)$        $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \dots\dots\dots$

γ)  $g(x) = (2f(x))^2$        $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \dots\dots\dots$

δ)  $g(x) = \frac{2f(x) - 1}{5 - 3f(x)}$        $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \dots\dots\dots$

ε)  $g(x) = \sqrt[3]{-8f(x) + 11}$        $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \dots\dots\dots$

3. \* Να συμπληρώσετε τα παρακάτω όρια:

α)  $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 6x - 1) = \dots\dots\dots$

β)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + 1}{3x} = \dots\dots\dots$

γ)  $\lim_{x \rightarrow 3} (5\sqrt{6x - 1}) = \dots\dots\dots$

δ)  $\lim_{x \rightarrow -1} [(3x + 2)(5x - 3)]^2 = \dots\dots\dots$

ε)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} [\eta\mu x + 3\sigma\upsilon\nu x] = \dots\dots\dots$

στ)  $\lim_{x \rightarrow 0} [2\eta\mu x - 4\sigma\upsilon\nu x] = \dots\dots\dots$

4. \* Να συμπληρώσετε τα παρακάτω όρια:

α)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \dots\dots\dots$

β)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^4 - 16}{x^3 + 8} = \dots\dots\dots$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 5x + 3}{2(x+1)} = \dots\dots\dots$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 4x - 5} = \dots\dots\dots$$

5. \* Να συμπληρώσετε τις τιμές των παραγώγων των παρακάτω συναρτήσεων στα αντίστοιχα σημεία:

$$\alpha) f(x) = x^2 \quad f'(0) = \dots\dots\dots$$

$$\beta) f(x) = x^2 + 1 \quad f'(1) = \dots\dots\dots$$

$$\gamma) f(x) = 2x^2 - 3 \quad f'(-1) = \dots\dots\dots$$

$$\delta) f(x) = \eta\mu x \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \dots\dots\dots$$

$$\epsilon) f(x) = \frac{1}{x^2 - 2} \quad f'(0) = \dots\dots\dots$$







6. \* Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων των γραφικών παραστάσεων των παρακάτω συναρτήσεων στα αντίστοιχα σημεία:

$$\alpha) f(x) = x^2 - 1 \quad A(0, f(0)) \quad y = \dots\dots\dots$$

$$\beta) f(x) = 2x^2 - 1 \quad A(1, f(1)) \quad y = \dots\dots\dots$$

$$\gamma) f(x) = 3x^2 - 2 \quad A(-1, f(-1)) \quad y = \dots\dots\dots$$

7. \* Για κάθε γραφική παράσταση της  $y = f(x)$  χαράξτε την αντίστοιχη γραφική παράσταση



της πρώτης παραγώγου της.

8. \* Στη στήλη Α δίνονται τύποι συναρτήσεων. Συμπληρώστε στη στήλη Β τους αντίστοιχους τύπους των πρώτων παραγώγων τους.

Στήλη Α $f(x)$	Στήλη Β $f'(x)$
$x - 1$	
$(x - 1)^2$	
$(x^2 - 1)^2$	
$(x - 1)^{\frac{2}{3}}$	
$\frac{1}{(x - 1)^2}$	
$\frac{1}{\sqrt{x - 1}}$	
$\frac{1}{\sqrt{(x - 1)^3}}$	

9. \* Στη στήλη Α δίνονται τύποι συναρτήσεων. Συμπληρώστε στη στήλη Β τους αντίστοιχους τύπους των πρώτων παραγώγων τους.

Στήλη Α $f(x)$	Στήλη Β $f'(x)$
$\sqrt{\eta\mu x}$	
$\sqrt{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x}$	
$x - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$	
$\frac{x}{\sqrt{\eta\mu x}}$	
$\frac{\eta\mu x}{\sqrt{x}}$	

10. \* Στη στήλη Α δίνονται τύποι συναρτήσεων. Συμπληρώστε στη στήλη Β τους αντίστοιχους τύπους των πρώτων παραγώγων τους.

Στήλη Α $f(x)$	Στήλη Β $f'(x)$
$x - \ln x$	
$x \cdot e^{\frac{1}{x}}$	
$e^{-2x^3+1}$	
$\ln \sqrt{x^2 - 2}$	



11. \* Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τύποι τεσσάρων συναρτήσεων. Να συμπληρώσετε τη στήλη Β με το αντίστοιχο πεδίο ορισμού τους, τη στήλη Γ με την πρώτη παράγωγό τους και τη στήλη Δ και τη δεύτερη παράγωγό τους.

Στήλη Α	Στήλη Β πεδίο ορισμού	Στήλη Γ πρώτη παρά- γωγος	Στήλη Δ δεύτερη παρά- γωγος
$h(x) = \frac{1}{x^2}$			
$\varphi(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$			
$f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$			
$g(x) = \frac{x - 1}{x^2}$			

### Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = x^2 - 3x + 2$ . Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της, Α

β) για ποιες τιμές του  $x \in A$  έχουμε  $f(x) = 0$

γ) το πεδίο ορισμού Β της συνάρτησης  $g(x) = \frac{2x}{x^2 - 3x + 2}$

2. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $g$  με  $g(x) = x^2 + 2$ .

α) Για ποιες τιμές του  $x \in \mathbb{R}$  έχουμε  $g(x) = 0$ ;

β) Να βρείτε: i) το πεδίο ορισμού Α της συνάρτησης  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 2}$

ii) το πεδίο ορισμού Β της συνάρτησης  $h(x) = \sqrt{x^2 + 2}$

3. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $g$  με  $g(x) = x^2 - 1$ .

α) Για ποιες τιμές του  $x \in \mathbb{R}$  έχουμε  $g(x) = 0$ ;

β) Για ποιες τιμές του  $x \in \mathbb{R}$  η συνάρτηση  $g(x)$  είναι θετική;

γ) Να βρείτε: i) το πεδίο ορισμού Α της συνάρτησης  $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$

ii) το πεδίο ορισμού Β της συνάρτησης  $h(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

iii) το πεδίο ορισμού Γ της συνάρτησης  $\varphi(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 1}}$

4. \*\* Δίνεται η συνάρτηση g με  $g(x) = x - 4$ .

α) Για ποιες τιμές του  $x \in \mathbb{R}$  έχουμε  $g(x) = 0$ ;

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού Α της συνάρτησης  $f(x) = \frac{2x - 1}{x - 4}$

5. \*\* Δίνονται οι συναρτήσεις f, g με  $f(x) = x^2 - 4x - 2$  και  $g(x) = 3x - 2$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:

α) τον τύπο της συνάρτησης  $f(x) + g(x)$  και να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της, Α

β) τον τύπο της συνάρτησης  $3f(x) - 2g(x)$  και να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της, Β

γ) τον τύπο της συνάρτησης  $f(x) \cdot g(x)$  και να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της, Γ

δ) τον τύπο της συνάρτησης  $\frac{f(x)}{g(x)}$  και να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της, Δ

6. \*\* Δίνονται οι συναρτήσεις f, g με  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ ,  $g(x) = 5x^2 - 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:

α) το  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  και το  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

β) το  $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + 2g(x)]$

7. \*\* Δίνεται η συνάρτηση φ με  $\varphi(x) = \frac{3x - 2}{2x + 3}$ . Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της, Α

β) το  $\lim_{x \rightarrow 1} \varphi(x)$

γ) το  $\lim_{x \rightarrow 1} [\varphi(x)]^3$

8. \*\* Δίνεται η συνάρτηση f με  $f(x) = \sqrt{6x^2 - 2}$ . Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της, Α

β) το  $\lim_{x \rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{3}} f(x)$

9 \*\* Δίνονται οι συναρτήσεις  $f, g$  με  $f(x) = 6x^3 + 5x - 1$ ,  $g(x) = 2x - 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Να βρείτε:

α) τα  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$

β) το  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{g(x)}$

10. \*\* Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -2$ , να βρείτε το  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$ , όταν:

α)  $\varphi(x) = 3f(x)$

β)  $\varphi(x) = 3f(x) - 2$

γ)  $\varphi(x) = \frac{5f(x)}{f^3(x) - 2}$

δ)  $\varphi(x) = \sqrt{2f^2(x) - 1}$

11. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ . Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της,  $A$

β) το  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

12. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{9x^2 - 1}{3x + 1}$ . Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της,  $A$

β) το  $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} f(x)$

13. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}$ . Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της,  $A$

β) το  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

14. \*\* Για ποιες τιμές του  $a \in \mathbb{R}$  η συνάρτηση  $f(x) = \frac{3x - 1}{x^2 + a}$  έχει πεδίο ορισμού το σύνολο  $\mathbb{R}$  των πραγματικών αριθμών;

15. \*\* Για ποιες τιμές του  $a \in \mathbb{R}$  η συνάρτηση  $f(x) = \frac{2x - 3}{x^2 - 4x + (a + 2)}$  έχει πεδίο ορισμού το σύνολο  $\mathbb{R}$  των πραγματικών αριθμών;

16. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{x - 2}{x + 4}$ . Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της,  $A$

β) το  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ .

γ) Να εξετάσετε, αν η  $f(x)$  είναι συνεχής στη θέση  $x_0 = 1$ .

17. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2, & x \neq 3 \\ a, & x = 3 \end{cases}$ .

α) Για  $x \neq 3$  είναι συνεχής η συνάρτηση;

β) Για ποια τιμή του  $a \in \mathbb{R}$  η συνάρτηση  $f(x)$  είναι συνεχής στο σημείο  $x_0 = 3$ ;

18. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}, & x \neq 2 \\ a, & x = 2 \end{cases}$ . Να βρείτε:

α) το  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

β) την τιμή του  $a \in \mathbb{R}$ , ώστε η συνάρτηση  $f$  να είναι συνεχής στο σημείο  $x_0 = 2$ .

19. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \begin{cases} \frac{-x + x^2}{x - 1}, & x \neq 1 \\ a, & x = 1 \end{cases}$ . Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της,  $A$

β) το  $\lim_{x \rightarrow +1} \frac{-x + x^2}{x - 1}$

γ) την τιμή του  $a \in \mathbb{R}$ , ώστε η  $f$  να είναι συνεχής στο σημείο  $x_0 = 1$

20. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}, & x \neq 2 \\ a, & x = 2 \end{cases}$ . Να βρείτε την τιμή του  $a \in \mathbb{R}$ ,

ώστε η συνάρτηση  $f$  να είναι συνεχής στο σημείο  $x_0 = 2$ .

21. \*\* Η διαγώνιος ενός τετραγώνου είναι  $\delta$ . Να εκφράσετε, ως συνάρτηση της διαγωνίου  $\delta$ :

α) την περίμετρό του      β) το εμβαδό του

22. \*\* Οι κάθετες πλευρές  $AB$ ,  $AG$  ενός ορθογωνίου τριγώνου  $AB\Gamma$  ( $A = 90^\circ$ ) μεταβάλλονται έτσι ώστε το εμβαδό του να παραμένει σταθερό και ίσο με  $12 \text{ m}^2$ . Να εκφράσετε το μήκος  $x$  της πλευράς  $AB$ , ως συνάρτηση του μήκους  $y$  της πλευράς  $AG$ .

23. \*\* Ένας κυκλικός τομέας ακτίνας  $r$  έχει εμβαδό  $30 \text{ cm}^2$ . Να εκφράσετε την περίμετρό του, ως συνάρτηση της ακτίνας  $r$ .

24. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{x^2}{3}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- α) την  $f'(3)$
  - β) το συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης της συνάρτησης  $f$ , στο σημείο με  $x = 3$
  - γ) την εξίσωση της παραπάνω εφαπτομένης
25. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = ax^2$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .
- α) Να βρείτε την  $f'(2)$ .
  - β) Να προσδιορίσετε το  $a$ , ώστε ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης της  $f$  στο σημείο  $(2, f(2))$  να είναι 4.
26. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .
- α) Να βρείτε την  $f'(0)$ .
  - β) Να προσδιορίσετε το συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης της  $f$  στο σημείο με  $x = 0$ .
  - γ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης της  $f$  στο σημείο  $(0, f(0))$ .
27. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = x^2 - 5x + 6$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- α) την  $f'(x)$
  - β) την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f$ , που είναι παράλληλη στον άξονα  $x'x$ .
28. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = 2x^2 - ax$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .
- α) Να βρείτε την  $f'(2)$ .
  - β) Να προσδιορίσετε το  $a$ , ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f$  στο σημείο  $(2, f(2))$  να σχηματίζει με τον άξονα  $x'x$  γωνία  $45^\circ$ .
29. \*\* Να βρεθεί η γωνία που σχηματίζει με τον άξονα  $x'x$  η εφαπτομένη της καμπύλης, που είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης  $f(x) = -2x^2 + x - 3$  στο σημείο  $(\frac{1}{4}, f(\frac{1}{4}))$ .

- 30. \*\*** Η θέση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα, δίνεται συναρτήσει του χρόνου από τον τύπο  $S(t) = 2t + t^2$ , όπου το  $t$  μετριέται σε sec και το  $S$  σε μέτρα. Να βρείτε:
- τη μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα  $[0, 4]$  sec
  - τη στιγμιαία ταχύτητα του κινητού, όταν  $t = 1$  sec (1 sec μετά την εκκίνησή του).
- 31. \*\*** Η θέση ενός κινητού, που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση, δίνεται συναρτήσει του χρόνου  $t$  (σε sec) από τον τύπο  $S(t) = 3t^2 - t$ . Να βρείτε:
- τη μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα  $[2, 4]$  sec
  - τη στιγμιαία ταχύτητα του κινητού, όταν  $t = 3$  sec (3 sec μετά την εκκίνησή του).
- 32. \*\*** Η ταχύτητα, ενός κινητού, που κινείται ευθύγραμμα, συναρτήσει του χρόνου  $t$  (σε sec), δίνεται από τον τύπο  $v(t) = 3t^2 - 5$ .
- Να εκφράσετε το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας (επιτάχυνση) του κινητού ως προς  $t$ , όταν  $t = t_0$ .
  - Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας (επιτάχυνση) του κινητού ως προς  $t$ , όταν  $t = 10$  sec (10 sec μετά την εκκίνησή του).
- 33. \*\*** Ένας πληθυσμός μικροβίων  $P$  μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου  $t$  (σε ώρες) σύμφωνα με τον τύπο  $P(t) = 10^3 - 5 \cdot 10^2 (1 + t)^{-1}$ .
- Να βρείτε τον αρχικό αριθμό μικροβίων ( $t = 0$ ).
  - Να βρείτε τον αριθμό των μικροβίων όταν  $t = 9$  ώρες.
  - Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού των μικροβίων ως προς το χρόνο, όταν  $t = 9$  ώρες.
- 34. \*\*** Ο πληθυσμός  $A$  μιας περιοχής δίνεται, συναρτήσει του χρόνου  $t$  (σε έτη) από τον τύπο  $A(t) = 10 \cdot e^{0.04t}$  (σε χιλιάδες). Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού αυτής της περιοχής, ως προς το χρόνο, ύστερα από 25 έτη.
- 35. \*\*** Δίνονται οι συναρτήσεις  $f, g$  με  $f(x) = \frac{x^3}{e^x}$ ,  $g(x) = e^x \cdot x^2$ . Να βρείτε:
- Την πρώτη παράγωγο i) της  $f$  και ii) της  $g$ .
  - Τις παραγώγους i)  $f'(1)$  και ii)  $g'(1)$ .
- 36. \*\*** Να βρείτε πολώνυμο  $P(x)$  τρίτου βαθμού, τέτοιο ώστε  $P(0) = -1$ ,  $P'(1) = 5$ ,  $P'(0) = 2$ ,  $P''(1) = 2$ .
- 37. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = 2x - x^2$ .
- Να βρείτε: i) την  $f'(x)$  ii) την  $f''(x)$
  - Να αποδειχθεί ότι:  $(1 - x)f''(x) + f'(x) = 0$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .
- 38. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = e^{2x}$ .
- Να βρείτε: i) την  $f'(x)$  ii) την  $f''(x)$
  - Να δείξετε ότι:  $2f'(x) - f''(x) = 0$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

39. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = e^{\alpha x}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- Την  $f'(x)$
  - Την  $f''(x)$
  - Τις τιμές του  $\alpha$ , ώστε να ισχύει η σχέση  $f''(x) + 2f'(x) = 3f(x)$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .
40. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = (3x - 2) \cdot \sqrt{(x+1)^3}$ . Να βρείτε:
- Την  $f'(x)$
  - Το  $f'(0)$ .
41. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ . Να βρείτε:
- Το πεδίο ορισμού της,  $A$
  - Την  $f'(x)$ .
42. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ . Να βρείτε:
- Το πεδίο ορισμού της,  $A$
  - Την  $f'(x)$ .
43. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{1 - \eta\mu x}{1 - \sigma\upsilon\nu x}$ . Να βρείτε:
- Το πεδίο ορισμού της,  $A$
  - Την  $f'(x)$ .
44. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 3x + 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- Την  $f'(x)$
  - Τα σημεία της καμπύλης της συνάρτησης, στα οποία οι εφαπτόμενες σ' αυτήν, είναι παράλληλες στον άξονα  $x'x$ .
45. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = (x + 1)^2$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- Την  $f'(x)$
  - Το συντελεστή διεύθυνσης  $\lambda$  της εφαπτομένης της καμπύλης της  $f$  στο σημείο με τεταγμένη 4.
46. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = -x^2 + 3x - 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- Την  $f'(x)$
  - Την εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης της  $f$ , που σχηματίζει με τον άξονα  $x'x$  γωνία  $135^\circ$ .
47. \*\* Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = a(x + 1)^2$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

- α) Να βρείτε την  $f'(x)$ .
- β) Να προσδιορίσετε τον  $a$ , ώστε ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της καμπύλης της  $f$  στο σημείο  $(1, f(1))$  να είναι 4.
- γ) Να βρείτε την εξίσωση της παραπάνω εφαπτομένης ευθείας.
- 48. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = x^2 - 4x + 2, x \in \mathbb{R}$ .
- α) Να βρείτε την  $f'(x)$
- β) Να προσδιορίσετε το σημείο  $A$  της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f$ , στο οποίο η εφαπτομένη της σχηματίζει γωνία  $45^\circ$  με τον άξονα  $x'x$ .
- 49. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = 2x^2 - ax + \beta, a, \beta \in \mathbb{R}$  και η ευθεία  $y = 3x - 1, x \in \mathbb{R}$ . Να υπολογίσετε τα  $a, \beta$  ώστε η ευθεία  $y = 3x - 1$  να είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της  $f$  στο σημείο με τετμημένη 2.
- 50. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 2x + 1, x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- α) Την  $f'(x)$ .
- β) Τις εξισώσεις των εφαπτομένων της γραφικής παράστασης της  $f$ , που είναι παράλληλες στην ευθεία  $y = x + 3$ .
- 51. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{2}{x^2}, x \in \mathbb{R}, x \neq 0$ .
- α) Να δείξετε ότι  $f'(a) = -\frac{4}{a^3}$  για κάθε  $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$ .
- β) Να προσδιορίσετε την εξίσωση της ευθείας που εφάπτεται στο σημείο  $(a, \frac{2}{a^2})$  της γραφικής παράστασης της  $f$ .
- 52. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 3, x \in \mathbb{R}$ .
- α) Να βρείτε την  $f'(x)$ .
- β) Να εξετάσετε τη μονοτονία της.
- γ) Να προσδιορίσετε τα ακρότατά της (αν υπάρχουν).
- 53. \*\*** Δίνονται οι συναρτήσεις  $f, g$  με τύπους:  $f(x) = 2x^2 - 4x - 1$  και  $g(x) = 4x - x^2 + 2, x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- α) i) την  $f'(x)$  και ii) την  $g'(x)$ .
- β) Τις θέσεις για τις οποίες οι συναρτήσεις παρουσιάζουν ακρότατο
- γ) Τις τιμές των ακροτάτων αυτών.
- 54. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 5x - 2, x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:
- α) Την  $f'(x)$
- β) Για ποιες τιμές του  $x$  έχουμε  $f'(x) = 0$



- γ) Ποιες από τις παραπάνω τιμές των  $x$  είναι θέσεις ακροτάτων για την  $f$   
δ) Τις τιμές των ακροτάτων.
- 55. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \kappa x^2 + \lambda x + 3$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ .  
α) Να βρείτε τα  $\kappa, \lambda$  ώστε η  $f$  να έχει στη θέση  $x = 1$  τοπικό ακρότατο ίσο με  $-2$ .  
β) Τι είδους ακρότατο παρουσιάζει η συνάρτηση στη θέση  $x = 1$ ;
- 56. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = x^3 - 3x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρεθούν τα διαστήματα που η  $f$  είναι:  
α) Αύξουσα  
β) Φθίνουσα
- 57. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ .  
α) Να βρεθούν οι  $f'(x)$ ,  $f''(x)$ .  
β) Να μελετηθεί η συνάρτηση  $f$ , ως προς τη μονοτονία της.  
γ) Να προσδιοριστούν τα ακρότατά της (αν υπάρχουν).
- 58. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = (2x - x^2) e^x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .  
α) Να βρεθούν: i) το πεδίο ορισμού της, ii) η  $f'(x)$  και η  $f''(x)$ .  
β) Να μελετηθεί η  $f$  ως προς: i) τη μονοτονία της,  
ii) τα ακρότατά της και να εντοπιστούν αυτά, αν υπάρχουν.
- 59. \*\*** Δίνεται η συνάρτηση  $f$  με  $f(x) = \kappa x^3 + \lambda x^2 + 3x - 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ .  
α) Να βρείτε την  $f'(x)$ .  
β) Να προσδιορίσετε τα  $\kappa, \lambda$ , ώστε η  $f$  να έχει τοπικά ακρότατα στα σημεία με τετμημένες  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = -2$ .  
γ) Να βρείτε τις τιμές των ακροτάτων.
- 60. \*\*** Από όλα τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα με την ίδια περίμετρο, ποιο είναι εκείνο που έχει το μέγιστο εμβαδό;
- 61. \*\*** Από όλα τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα με εμβαδό  $1600 \text{ m}^2$ , να βρείτε τις διαστάσεις εκείνου, που έχει την μικρότερη περίμετρο.
- 62. \*\*** Να αποδείξετε ότι από όλα τα ισοσκελή τρίγωνα, που είναι εγγεγραμμένα σε κύκλο ακτίνας  $R$ , το ισόπλευρο έχει μεγαλύτερο εμβαδό.
- 63. \*\*** Να βρεθούν δύο αριθμοί  $x, y$  με σταθερό άθροισμα  $12$ , που να έχουν το μεγαλύτερο γινόμενο.
- 64. \*\*** Η τιμή πώλησης ενός μηχανικού εξαρτήματος είναι  $1.000$  δρχ. Το κόστος του συναρτήσεως του χρόνου κατασκευής (σε ώρες) προσεγγίζεται από τον τύπο της συνάρτησης:  
$$K(t) = t^2 + 250t^{-1}$$
  
α) Πότε πραγματοποιήθηκε το μέγιστο κέρδος;

β) Πόσο είναι αυτό;

65. \*\* Η ενέργεια που καταναλώνει ένας μικροοργανισμός που κινείται μέσα στο αίμα ενός ασθενούς με ταχύτητα  $v$ , προσεγγίζεται από τον τύπο της συνάρτησης:

$$E(v) = \frac{1}{v} [2(v - 35)^2 + 750]$$

α) Με ποια ταχύτητα πρέπει να κινηθεί για να καταναλώσει τη μικρότερη ενέργεια;

β) Πόση είναι η ελάχιστη ενέργεια;

66. \*\* Η ενέργεια  $W(t)$ , που αποδίδεται από ένα πηνίο, μεταβάλλεται με το χρόνο  $t$  σύμφωνα με τον τύπο της συνάρτησης:

$$W(t) = 6t^2 - t^4$$

και μετριέται σε Joules.

α) Να εκφράσετε το ρυθμό μεταβολής της ενέργειας ως προς το χρόνο (την ισχύ του πηνίου) τη χρονική στιγμή  $t = t_0$ .

β) Σε ποια χρονική στιγμή το πηνίο έχει μέγιστη ισχύ;

γ) Πόσα Watt είναι η μέγιστη ισχύς;

67. \*\* Η τιμή εισιτηρίου των αστικών λεωφορείων είναι σταθερή τα τελευταία 8 χρόνια στις 100 δρχ. Το κόστος μεταφοράς ανά επιβάτη στη διάρκεια των 8 χρόνων προσεγγίζεται από τον τύπο της συνάρτησης:

$$K(t) = t^2 + \frac{250}{t}$$

όπου  $t \in (0, 8]$  ο χρόνος.

α) Να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το μέγιστο κέρδος.

β) Πόσο είναι αυτό το κέρδος;

68. \*\* Η θετική αντίδραση ενός οργανισμού σ' ένα φάρμακο περιγράφεται (δίνεται) από τον τύπο της συνάρτησης  $f(x) = x^2(a - x)$ ,  $a > 0$  σταθερά και  $x$  η ημερήσια δόση του φαρμάκου σε mg. Ποια είναι η ενδεδειγμένη ποσότητα δόσης του φαρμάκου ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη θετική αντίδραση του οργανισμού;

69. \*\* Ένα εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής παρασκευάζει μεταξύ άλλων ταψάκια γαλακτομπούρεκου. Υπολογίστηκε ότι η παρασκευή  $x$  ταψιών την εβδομάδα κοστίζει περίπου  $(\frac{x^2}{4} + 25x + 25)$  δρχ. Αν η τιμή πώλησης του ταψιού είναι  $(1000 - \frac{x}{2})$  δρχ., πόσα ταψάκια γαλακτομπούρεκο πρέπει να παράγει την εβδομάδα, ώστε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος;